



PROYECTO FARO

Información y acompañamiento
en el embarazo ectópico

EMBARAZO ECTÓPICO

Información para entender, cuidar y tomar decisiones



¿QUÉ ES?

El embarazo ectópico ocurre cuando un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, la mayoría de las veces en una de las trompas de Falopio.

No puede continuar desarrollándose de forma segura y puede poner en riesgo la vida de la persona gestante si no se trata a tiempo.



COMPARACIÓN: EMBARAZO NORMAL VS ECTÓPICO

EMBARAZO NORMAL



El óvulo fertilizado viaja por la trompa de Falopio y se implanta en el útero.



Puede desarrollarse y continuar de forma segura.

EMBARAZO ECTÓPICO



El óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, generalmente en la trompa de Falopio.



No puede desarrollarse y puede causar complicaciones graves.



¿CÓMO OCURRE?

Después de la fertilización, el óvulo debería viajar por la trompa hasta el útero. En un embarazo ectópico, el óvulo se implanta antes de llegar al útero.

Factores que pueden aumentar el riesgo:

- Antecedentes de embarazo ectópico
- Infecciones pélvicas previas
- Cirugías en las trompas
- Endometriosis
- Tabaquismo
- Uso de DIU



SÍNTOMAS

Los síntomas pueden variar y a veces se confunden con un embarazo normal. Consulta de inmediato si presentas:



Manchado o sangrado vaginal



Dolor en un lado del abdomen o en la pelvis



Dolor en el hombro



Mareos o desmayos



Náuseas o malestar

Si el dolor es intenso o el sangrado es abundante, busca atención médica de urgencia.



DIAGNÓSTICO

Se realiza a través de:



Prueba de embarazo (β -hCG en sangre)



Ecografía transvaginal



Evaluación clínica y antecedentes médicos

Un diagnóstico temprano es clave para tu seguridad y para elegir el tratamiento adecuado.



TRATAMIENTOS

El tratamiento depende de tu estado de salud, los niveles de hCG y el tamaño del embarazo.

1. Medicamento

Metotrexato: detiene el crecimiento del tejido del embarazo.

Se usa cuando el embarazo es detectado temprano y no hay complicaciones.



2. Cirugía

Puede ser necesaria si hay ruptura de la trompa, sangrado interno o si el medicamento no es adecuado.

Puede realizarse por laparoscopia (mínimamente invasiva) o, en algunos casos, por laparotomía.



¿QUÉ DEBES SABER?



No es tu culpa.
Muchas veces no hay una causa identificable.



Es una pérdida.
Tus emociones son válidas y merecen ser cuidadas.



No estás sola.
Busca apoyo, informa tus dudas y rodeáte de personas que te acompañen.



Puedes volver a intentarlo.
En la mayoría de los casos es posible tener un embarazo saludable en el futuro.



RECUERDA

Escuchar tu cuerpo y buscar atención a tiempo puede marcar la diferencia.

Tu salud importa.



PROYECTO FARO

Acompañamos tu proceso con información clara, contención y empatía.
Juntas iluminamos el camino.

